

予防接種の受け方 1

予防接種についての詳細は『予防接種と子どもの健康』をご覧ください。

定期予防接種の種類		対象年齢・接種間隔・回数	標準的な接種期間
五種混合 (DPT-IPV -Hib)	1期初回	『生後2月から生後90月に至るまでの間にある者』 20日以上、標準的には56日までの間隔をおいて3回	生後2月～生後12月に達するまでの期間
	1期追加	『生後2月から生後90月に至るまでの間にある者』 1期初回接種終了後6月以上の間隔をおいて1回	1期初回3回目終了後12月～18月までの間隔をおく
四種混合 (DPT-IPV) 不活化ポリオ (IPV)	1期初回	『生後2月から生後90月に至るまでの間にある者』 20日以上、標準的には56日までの間隔をおいて3回	生後2月～生後12月に達するまでの期間
	1期追加	『生後2月から生後90月に至るまでの間にある者』 1期初回接種終了後6月以上の間隔をおいて1回	1期初回3回目終了後12月～18月までの間隔をおく
二種混合 (DT)	2期	『11歳以上13歳未満の者』 (通知対象)小学6年生 平成24年4月2日生～平成25年4月1日生の者	11歳～12歳に達するまでの期間
麻しん風しん (MR)	1期	『生後12月から生後24月に至るまでの間にある者』	1歳を過ぎたら早期に
	2期	『5歳以上7歳未満の者で、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者』 対象:保育所・幼稚園の年長児 平成30年4月2日～平成31年4月1日生の者	R6.4.1～R7.3.31に接種
麻しん	MRに 準じる	※原則として、MRワクチンを接種 麻しんの単ワクチンは、風しんの罹患者で、保護者が強く希望する者のみ接種	MRに準じる
風しん		※原則として、MRワクチンを接種 風しんの単ワクチンは、麻しんの罹患者で、保護者が強く希望する者のみ接種	

水痘	初回	『生後12月から生後36月に至るまでの間にある者』 初回1回	生後12月～生後15月に達するまでの期間
	追加	追加は初回接種終了後3月以上の間隔をおいて1回	初回接種終了後6月～12月までの間隔をおく
BCG		『生後1歳に至るまでの間にある者』	生後5月～8月に達するまでの期間
B型肝炎		『平成28年4月1日以後に生まれた、生後1歳に至るまでの間にある者』 27日以上の間隔をおいて2回接種した後、 第1回目の注射から139日以上の間隔をおいて1回接種する	生後2月に至った時から生後9月に至るまでの期間
Hib (ヒブ)	初回	『生後2月から生後60月に至るまでの間にある者』 <u>生後2か月から6か月で開始</u> 生後12月に至るまでの間に、27日以上の間隔をおいて3回。 <u>生後7か月から11か月で開始</u> 生後12月に至るまでの間に、27日以上の間隔をおいて2回。 <u>生後12か月から59か月で開始</u> 1回接種	初回接種開始は、生後2月～生後7月に至るまでの間
	追加	<u>生後2か月から6か月で開始</u> 初回接種終了後7月以上、標準的には13月までの間隔をおいて1回。 ただし、生後12月までに3回の初回接種を終了せずに生後12月以降に追加接種を行う場合は、初回接種終了後27日以上の間隔をおいて1回。 <u>生後7か月から11か月で開始</u> 初回接種終了後7月以上、標準的には13月までの間隔をおいて1回。 ただし、生後12月までに2回の初回接種を終了せずに生後12月以降に追加接種を行う場合は、初回接種終了後27日以上の間隔をおいて1回。	追加接種は初回接種終了後7月～13月の間隔をおく

小児用肺炎球菌 (PCV13) (PCV15)	初 回	<p>『生後 2 月から生後 60 月に至るまでの間にある者』</p> <p>生後 2 か月から 6 か月で開始 生後 24 月に至るまでの間に 27 日以上の間隔をおいて 3 回。ただし、2 回目の接種が生後 12 月を超えた場合、3 回目の接種は行わない。</p> <p>生後 7 か月から 11 か月で開始 生後 24 月に至るまでの間に 27 日以上の間隔をおいて 2 回。</p> <p>生後 12 か月から 23 か月で開始 60 日以上の間隔をおいて 2 回</p> <p>生後 24 か月から 59 月で開始 1 回接種</p>	初回接種開始は、生後 2 月～生後 7 月に至るまでの間
	追 加	<p>生後 2 か月から 6 か月で開始 初回接種終了後 60 日以上の間隔をおいて、生後 12 月に至った日以降において 1 回。</p> <p>生後 7 か月から 11 か月で開始 初回接種終了後 60 日以上の間隔をおいて、生後 12 月に至った日以降において 1 回</p>	追加接種は生後 12 月～15 月に至るまでの間
日本脳炎	1 期	<p>『生後 6 月から生後 90 月に至るまでの間にある者』</p> <p>【初回接種】6 日以上、標準的には 28 日までの間隔をおいて 2 回</p> <p>【追加接種】初回接種終了後 6 月以上、標準的にはおおむね 1 年の間隔をおいて 1 回 (通知対象)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・3 歳になる者 令和 3 年 4 月 2 日～令和 4 年 4 月 1 日生の者 ・4 歳になる者 令和 2 年 4 月 2 日～令和 3 年 4 月 1 日生の者 ・5 歳になる者 平成 31 年 4 月 2 日～令和 2 年 4 月 1 日生の者 	<p>(初回) 3 歳～4 歳に達するまでの期間</p> <p>(追加) 4 歳～5 歳に達するまでの期間</p>
	2 期	<p>『9 歳以上 13 歳未満の者』 (通知対象)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・9 歳になる者 平成 27 年 4 月 2 日～平成 28 年 4 月 1 日生 ※毎月、誕生日の翌月中旬頃に対象者へ発送 ・18 歳になる者(1 期終了者) 平成 18 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生の者 	9 歳～10 歳に達するまでの期間

特例措置 平成16年4月2日～平成19年4月1日生まれで、1期・2期の接種が終わっていないお子さんは、20歳未満までの間、接種を受けることができます。

- ☆ 1期を一度も接種していない方は、標準的な接種スケジュールに沿って接種してください。
- ☆ 既に1期の接種を1回又は2回受けた方は、前回の接種から接種間隔が開いても差し支えないので、(6日以上の間隔をおいて)残りの回数を接種してください。
- ☆ 2期は、1期接種を終えた後、6日以上の間隔をおいて接種してください。

種類	年齢	接種済み回数	接種回数
1期	6か月以上20歳未満	1回接種	のこり2回接種
		2回接種	のこり1回接種
		0回接種	のこり3回接種
2期	9歳～20歳未満	3回接種	1回接種

『小学校6年生から高校1年生相当年齢の女子』
いずれのワクチンも合計3回接種。

2価ワクチン(サーバリックス)

1月以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から5月以上、かつ2回目の接種から2月半以上の間隔をおいて1回。

4価ワクチン(ガーダシル)

1月以上の間隔をおいて2回接種した後、3月以上の間隔をおいて1回。

9価ワクチン(シルガード9)

1月以上の間隔をおいて2回接種した後、3月以上の間隔をおいて1回。

(通知対象)

- ・中1になる女子
平成23年4月2日～平成24年4月1日生の者
- ・高1になる女子
平成20年4月2日～平成21年4月1日生の者

13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間
(中学1年生)

※キャッチアップ接種(積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方への接種)

対象者:平成9年4月2日～平成20年4月1日生の者
期間:令和4年4月1日～令和7年3月までの3年間

『令和2年8月1日以後に生まれたそれぞれのワクチンごとに規定する期間にある者』

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(ロタリックス)

出生6週0日後から24週0日後までの間に27日以上の間隔をおいて2回

5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン(ロタテック)

出生6週0日後から32週0日後までの間に27日以上の間隔をおいて3回

初回接種は生後2月
に至った日から出生
14週6日後までの間

子宮頸がん

ロタウイルス

任意予防接種(おたふくかぜ)費用一部助成について

日南市では、平成30年4月1日から、任意接種(希望者が個別に病院で受ける予防接種)である流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)の接種費用の一部を助成しています。

【助成対象者】

1期:1歳から2歳未満の子ども

※ピヨピヨ10か月教室のときに案内しています。

2期:5歳から7歳未満で、小学校入学前の子ども

(H30.4.2 から H31.4.1 の間に生まれた子ども)

※麻しん・風しん2期と一緒に案内しています。

【助成金額】

1回につき2,500円(1期1回、2期1回の助成)

予防接種の受け方 2

異なる種類のワクチンを接種する場合の間隔

【不活化ワクチン】

五種混合・四種混合・ポリオ・日本脳炎
二種混合・ヒブ・小児用肺炎球菌
B型肝炎
子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス)
インフルエンザ

制限なし

【全てのワクチン】

五種混合・四種混合・ポリオ・日本脳炎
二種混合・ヒブ・小児用肺炎球菌
B型肝炎
子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス)
BCG・麻しん風しん・水痘
ロタウイルス
おたふくかぜ・インフルエンザ

【経口生ワクチン】 ロタウイルス

【注射生ワクチン】

BCG・麻しん風しん・水痘
おたふくかぜ

27日以上あける

制限なし

【注射生ワクチン】

BCG・麻しん風しん・水痘・おたふくかぜ

【不活化ワクチン】

五種混合・四種混合・ポリオ・日本脳炎・
二種混合
ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎
子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス)
インフルエンザ

【経口生ワクチン】

ロタウイルス

予防接種に行く前に



- ◇ 予防接種の前日は入浴し、身体を清潔にしましょう。
- ◇ 体調はよいですか。
- ◇ 当日受ける予防接種について理解していますか。(「予防接種と子どもの健康」をお読みください。)
- ◇ 予診票は大切な資料となります。しっかり記入しましょう。
- ◇ 母子健康手帳は大切な記録です。忘れずに持参しましょう。気にかかることがあれば、遠慮なくご相談を！！

予防接種を受けた後に



- ◇ 予防接種を受けた後30分は、接種場所でお子さんの様子を観察しましょう。
やむを得ず接種場所を離れなければならない場合は、すぐに先生と連絡がとれるようにしておきましょう。
(急な副反応は、この間に起こることがあります。)
- ◇ 不活化ワクチンでは24時間、生ワクチンでは3週間は副反応の出現に注意して観察しましょう。
- ◇ 当日は、はげしい運動をさせないようにしましょう。
- ◇ 入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすらないように注意しましょう。